

活

人

書

按仲景百
十二方小
柴胡其一
凡六十餘
証用之清
裏解表第
一藥也世
俗去而不
用傍求雜
藥適自誤
耳奉議此
戒厥意應
入安授于
六脈遲細
表裏無熱
著遂便後
天是非也

活人書卷第八

此一卷論發熱大抵傷寒寒多易治熱多難愈傷
寒發熱者以其寒極則生熱治法多用冷藥故令
熱不去仲景熱多寒少用桂枝二越婢一湯不渴
外有微熱者用小柴胡加桂湯皆溫表之義也近
時多行小柴胡湯不問陰陽表裏凡傷寒家皆令
服之此藥差寒不可輕用雖不若大柴胡湯小承
氣湯之緊要之藥病不相主其爲害一也往往因
服小柴胡湯而成陰證者甚多仲景雖云傷寒中

卷之三

經方本

祚少陽下

同

諸音帝室

電

難去聲

陽音粉

漢書上

風有柴胡證但見一證便是不必悉具此為是少

陽證當服小柴胡不必少陽證悉具耳况本方又

有加減隨證增損古人方治審諦如此後人妄投

良可怪也



問發熱

答曰發熱而惡寒者屬太陽也

太陽病必發熱而惡寒蓋太陽主氣以溫

皮膚分肉寒氣留於外皮膚緻密則寒慄而發熱宜

發其汗麻黃湯正方主大青龍湯正方主桂枝湯正方主

惡寒者柴胡桂枝湯正方主桂枝二越婢一湯正方主

之若吐利而發熱惡寒者霍亂也太陽病發熱而渴

不惡寒者為溫病若發汗已身體灼熱者為風溫也

○素問云汗出而身熱者風熱也其人素傷於風因

汗多身熱者名風
連牛黃膏

瘦本無宜
下之三
作調胃本
領湯主之
七字

要症類

復傷於熱風熱相薄即對
熱常自汗出此名風溫也○身熱汗出漈漈然者屬

陽明也陽明病脈浮者宜桂枝調胃承氣湯下之方一微汗之脈實者

和解正六十四若陽明病發汗多者宜大承氣湯急下之

後不惡寒但熱者實也當和其胃氣宜調胃承氣湯

正四十三太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬於胃也

宜下
之
脈細頭疼嘔而發熱者屬少陽也少陽發熱小

正二十九不可發汗
發汗即譫語
病人不渴外有微熱者小柴胡加桂

也雞无小柴胡加桂主表熱最良此法不持傷寒也

仲景表有熱者小柴胡加桂也裏有熱者白虎加

人參也正五大抵身熱不飲水者為表熱也口燥煩

渴者為裏熱也二藥均治發熱然分表裏不可不知

也
病人無表裏證發熱七八日脈雖浮數宜大柴胡

全熱仲景
作合熱

發熱量篇

三陰俱有

發熱但微

甚不同如

少陰二証

外又有反

發熱不死

及一身手

足盡熱二

條四逆散

用柴胡亦

有治發熱

意若厥陰

元厥後發

湯下之正三十大便秘者加大黃假令已下脉數不解今熱則消

穀善飢至六七日不大便者有瘀血也抵當湯主之

正九十若傷寒差後更發熱者小柴胡湯正廿九主之浮脉

者以汗解脉實者可下之又問陰證有發熱者乎荅曰太陰厥陰

皆不發熱只少陰發熱有二證仲景謂之反發熱也

少陰病初得之發熱脉沉者麻黃細辛附子湯正三

主之少陰病脉沉發汗則動經此大畧之言耳脉應裏而發熱在表亦當以小辛之藥泄汗而溫散

也仲景云傷寒之病從風寒得之表中少陰病下利

風寒入裏則不消須用溫藥少汗而解

清穀裏寒外熱手足厥逆脉不出者通脉四逆湯主

熱而利者
及下利脉
數有微熱
與夫面赤
身微熱及
嘔而發熱
四肢煩疼
是三陰皆
有熱熱明
矣
按仲景太
陽云寒
多為自初
至今之証
若其人
唯清便欲
自可九字
本是愈之

之
六十二
足厥也

大抵陰證發熱終是不同脉湏沉或下利手



問熱多寒少

答曰太陽熱多寒少有三證有熱多寒少而不嘔清
便自可者有熱多寒少而脉微弱者有熱多寒少而
尺脉遲者其用藥皆不同也太陽病八九日如瘧狀
熱多寒少不嘔清便自可宜桂枝麻黃各半湯
熱多寒少而脉都大微弱者無陽也不可發汗宜桂
枝二越婢一湯
方三
主之
若脉浮雖熱多寒少亦自可發汗
熱多寒

証今反與
他証各半
湯汗之何
邪文按仲
實篇脉浮
實法當身
疼痛宜以
汗解之假
本尺中遲
者不可發
汗以榮氣
不足血少
故也今但
舉尺中遲
血少之語
而添熱多
兼少四字
又何耶此
八証邊証

治人書

少而尺中遲者血少也先以小建中加黃耆正三以

養其血尺尚遲再作一劑然後晡時用小柴胡湯正

元桂枝二越婢一湯正三輩小劑隨證治之

問潮熱

答曰潮熱者大率當下仲景云潮熱者實也大承氣

湯證云其熱不潮未可與也則知潮熱當下無疑矣

雖然更看脉與外證脉若弦若浮及外證惡寒猶有

表證且與小柴胡湯以解之正十九若腹大滿不通者

可與小承氣湯正四三微和其胃氣勿令大泄也仲景

正當收入
不可汗門
中不當附
熱多寒
也又
脈微弱
上添都大
二字豈仲
景論脈為
未定而加
之乎○別
本小劑隨
証治之作
小分劑以
和解之

輔發熱者屬陽明也脈實者大承氣正三十一縱使潮熱當

行大承氣亦須先少與小承氣若不轉矢氣不可攻

之復發熱復硬者大柴胡下之正三十一若胃腸滿而嘔

日晡發潮熱者小柴胡加芒消正三十四主之又有日晡

發潮熱已而微利者又有微發潮熱而大便澀者或

潮熱而咳逆者皆當用小柴胡也正三十九傷寒十三日

日晡發潮熱已而微利潮熱者實也先服小柴胡以

解外後以柴胡加芒消湯下之陽明潮熱大便澀胃

滿不去者小柴胡主之冬陽明潮熱當行黃芩湯冬陽明病脈

潮熱發作有時但脈浮者已上潮熱並屬陽明也太

接往來寒
 義者邪正
 分爭也邪
 氣入正氣
 亦與之爭
 則但熱而
 無寒若邪
 正分爭于
 是寒熱作
 也今以陰
 陽二氣相
 勝勝不云
 云後寒此
 論雜病陰

陽有潮熱乎仲景大陷胸湯一證正三六結胃有潮熱

者為大結胃屬太陽也關音通日加申時

問往來寒熱

答曰往來寒熱者陰陽相勝也陽不足則先寒後熱

陰不足則先熱後寒大抵有三證有表證而往來寒

熱者用小柴胡也正十九有裏證而往來寒熱者大柴

胡也正三十已表或已下而往來寒熱者皆可用柴胡

桂枝乾薑湯匡三仲景云血弱氣盡腠理開邪氣因入

與正氣分爭往來寒熱休作有時小柴胡主之又云

陽二氣自相乘摩然耳非可以詔傷寒也似非合仲景之意○
市音泉喜音戲痞音堅腰音硬悸音其季切

張仲景桂枝麻黃各半湯是治

傷寒五六日中風往來寒熱胃腸苦滿默默不欲食
心煩喜嘔或胃煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞
鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者小
柴胡主之傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者大柴
胡主之傷寒五六日已發汗復下之胃腸滿小便不
利渴而不嘔頭汗出往來寒熱心煩柴胡桂枝乾薑
湯也



問傷寒瘧狀

答曰形證似瘧有太陽證有陽明證有婦人熱入血

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少面皮反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必溼者也非治其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者為欲愈也

室證太陽證服桂枝湯

正二

大汗出脈洪大者與桂

枝湯如前法若形似瘧一日再發者汗出必解宜桂

枝二麻黃一湯

正三

傷寒八九日如瘧狀熱多寒少

其人不嘔清便欲自可日一二發者麻黃桂枝各半

湯

太陽證形似瘧寒熱等者與桂枝二麻黃一湯熱多寒少者麻黃桂枝各半湯正二有陽明

證病人煩熱汗出如瘧狀日晡發熱而脈浮虛者與

桂枝湯脈實者宜承氣湯

正四十三

婦人熱入血室其血

必結故使如瘧狀小柴胡主之

正二十九



問汗之而寒熱者

卷之八

補書通目
加由融

惡去下
同

答曰太陽證發汗後依前寒熱者須看脉如何若脉

浮數或洪大則表證猶在當再表也如桂枝湯

或桂枝二麻黃一

正三

之類證人為見已汗或已下

而發寒熱不敢再表誤矣蓋脉浮為在表表之必愈

也或得汗而解復如瘧狀日晡而發者此屬陽明也

若脉實者可下之宜大柴胡

正三十

大承氣

正四二

也若

發汗後只惡寒者虛也發汗後只發熱者實也只惡

寒屬芍藥甘草附子湯

正七三

只發熱屬調胃承氣湯

若厥陰證大汗出熱不去內拘急四肢疼又下

正四三

利厥逆而惡寒者四逆湯主之

正七五

金

問汗之而仍發熱者

答曰素問云溫病汗出輒復熱而脉躁疾不爲汗衰
狂言不能食謂之陰陽交交者死也又云熱病已得
汗而脉躁盛者死今不與汗相應是不勝其病也其
死明矣大抵病人得汗而脉靜者生今汗之而仍發
熱者若脉浮數則表證猶在汗之必愈也仲景云發汗解半日
許復熱煩脉浮數者可更發汗宜桂枝湯正二發汗後不敢再表者爲脉沉
實耳脉若浮者須再汗也發汗後不惡寒只發熱脉

脈音

脈音

更去声
脈音

病瘳
痿癰切

灼音勾

麻音標

沉實或狂語此為胃實陽盛即不可再汗也須當下

之設令下後又不解表裏邪亦衰矣

仲景云太陽病三日發汗不解

蒸蒸發熱者宜調胃承氣湯

正四三

和其胃氣也大鑿

云若傷寒得汗後熱不退發昏及狂言者便可用承氣湯

正四三下之

立愈未差再服若汗後熱不解但心下痞嘔逆又自

利大柴胡去大黃主之

正三十

又有太陽證合行桂枝

却用麻黃之類發汗多亡陽仍發熱者真武湯

晉望

主之更有風溫一證初得病熱而渴不惡寒雖發汗

已身灼熱者為風溫屬萎蕤湯

雜四玉

岐伯所謂汗出而身熱者風熱也

若傷寒得汗後病解虛羸微熱不去可行竹葉石膏

湯証九五

隨其虛實而治之

●

問下之而熱不退者

勢復食復附

答曰仲景云病人脉微而瀉為醫所病大發其汗使
 陽氣微又大下之使陰氣弱其人亡血病當惡寒後
 乃發熱無休止時蓋陽微則惡寒陰弱則發熱陽微
 惡寒四逆湯主之〔正七五〕陰弱發熱為內熱葶藶苦酒
 湯主之〔維十六〕大抵傷寒八日已上大發熱者此為難
 治仲景云脉陰陽俱虛熱不止者死又有醫人多用圓子藥下之身
 熱不去微煩者梔子乾姜湯主之〔正四九〕傷寒五六日

熱病後

寒去

刺本作千

金湯復起

死人麥門

冬湯廣濟

療急勞復

雄鼠黃湯

許仁則七

味葱白湯

張生声痞

天下之後身熱不去心中結痛者未欲解也梔子豉

湯主之正四十五又問傷寒差後發熱者何也答曰此名

勞食復也病新差血氣尚虛津液未復因勞動生熱

熱氣既還復入經絡名曰勞復神景云傷寒差已後

更發熱小柴胡湯主之正三十九脉浮者以汗解宜柴胡桂枝湯

正三十一脉實者以下解宜大柴胡湯正三十一又大病差後勞復者

枳實梔子湯主之正九六麥門冬湯雜見六雄鼠尿湯雜

十七七味葱白湯雜見八皆可選用○又食復者大病新

差脾胃尚弱穀氣未復強食過多停積不化因爾發

音經噫食
監勉全思

內音細
噫上声
職平声

熱名曰食復大抵新病差多因傷食便作痞乾噫食

臭腹中雷鳴下利等證可與生薑瀉心湯

正六十三

仲景

於枳實梔子湯證云若有宿食內大黃如薄棋子五

六枚服之愈

黃帝曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺者熱甚而強食故有所遺也

若此者皆病已衰而熱有所藏因其穀食相薄兩熱相合故有所遺也帝曰善治遺奈何岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已食肉則復多食則遺此其禁也

活人書卷第八終

醫家要略

同

去聲

活人書卷第九

此一卷首論惡寒大抵太陽病必發熱而惡寒惡寒家慎不可過當覆衣被及近火氣寒熱相薄脉道沉伏愈令病人寒不可遏但去被徹火兼飲以和表之藥自然不惡寒矣婦人惡寒尤不可近火寒氣入腹血室結聚針藥所不能治矣



問惡寒

答曰惡寒有二證發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也發於陽者宜解表脉必浮數屬桂

發仲景少陰惡寒而欲去衣被者不可治今欲作不欲厚衣何哉况惡寒最慎于下今言下之又何耶仲景云不可更發

枝湯

正一

桂枝二越婢一湯

正四

麻黃湯

正二十

青龍

湯

正二十六

證也發於陰者宜溫裏脉必沉細屬理中湯

正七四

四逆湯

正七五

證也

少陰病下利已惡寒而手足

若少陰病惡寒而手足自煩不欲厚衣用大柴胡湯下之

若發熱微惡寒者

屬柴胡桂枝湯也

正三十一

發汗後反惡寒者虛故也屬

芍藥甘草附子湯

正七二

脉微而惡寒者此陰陽俱虛

也不可更吐下也發汗面色赤有熱者為欲解宜桂

枝麻黃各半湯

正二

傷寒大下後復發其汗心下痞

惡寒者表未解也不可攻其痞當先解表表解乃可

面色
反不熱色
者未欲解
也今改作
不可更吐
下也發汗
面色尚有
熱者為欲
解何也
惡寒由寒
常作惡寒
乃由寒方
是 按仲
景白虎證
時時惡風
今云惡寒
何邪

攻痞解表宜桂枝湯

正一

攻痞大黃黃連瀉心湯

正

九
雖然太陽陽明少陰皆有惡寒要之太陽病或已
發熱或未發熱必惡寒也陽明證俱宜下唯惡寒中
寒為病在經與太陽令病屬表發其汗耳若吐若下
後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡寒者白
虎證也
又問有汗出惡寒者有汗出多而微惡
寒者有頭汗出而微惡寒者何也答曰仲景云太陽
病其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以鑿
下之也心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

按仲景篇
 傷寒無大
 熱口燥渴
 心煩背微
 惡寒者身
 加人參湯
 主之乃太
 陽證而非
 三陽合病
 也今去其
 微字而添
 口中不仁
 何耶有微
 字屬太陽
 無微字屬
 少陰之陽

正六十

陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發

汗宜桂枝湯也

正一

頭汗出而微惡寒者屬少陽宜

小柴胡湯也

正廿九

又問背惡寒者何也答曰背惡寒

有兩證三陽合病背惡寒者口中不仁口燥舌乾也

少陰病背惡寒者口中和也以此別之口中不仁口

燥舌乾而背惡寒者白虎加人參湯主之

正六五

口中

和而背惡寒者附子湯主之

正六八

仍灸之

神景云少陰病得之一二

日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之

太金

問惡風

寒與三陰

合病即是

兩感所以

仲景三陰

無合病例

也

惡去声也

皆衆

答曰惡風者衛中四時之虛風所以惡風也其人當

汗出而脉緩也數與桂枝湯

正二

桂枝加葛根湯

正

使遍體微潤連日當自解矣又有太陽病發汗多

亡陽遂漏不止衛虛而惡風者當溫其經也其人惡

風小便難

四肢微急難以屈伸者桂枝

枝加附子也

正三

若傷寒四

五身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者小柴

胡湯也

正三九

風濕相薄骨節疼痛煩掣痛不得屈伸汗

出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草

附子湯主之

正七上



問傷寒不得汗

答曰甲乙經云熱病脉常躁盛而不得汗者此陽脉

之極也死脉盛躁而得汗者生大抵傷寒榮衛俱病

則無汗麻黃湯正王葛根湯正王大青龍湯正王葱

豉湯維七四可選而用之若傷寒連服湯劑而汗不出

者死如中風法蒸之溫熱之氣於外迎之無不得汗

也薪火燒地良久掃除去火可以水洒之取蚕沙栢

上鋪蓆令病人當上臥溫覆之夏月熱只布單覆之

汗移時立至俟周身至脚心皆汗禁熱乃用溫湯撲

止汗移上來最得力者蚕沙桃栢葉也無蚕沙亦得

單桃葉亦得蒴藿亦可用麩糠乃助添令多爾不用

亦傷寒亦有氣虛不能作汗者仲景云脉浮而遲遲
是也今注
云木附湯
黃耆建中
湯皆收汗
藥則榮衛
實則邪無
從出內熱
裏矣真若
惜用各半
湯為穩
宜清氣

亦傷寒亦有氣虛不能作汗者仲景云脉浮而遲遲

為無陽不能作汗其身必痒宜桂枝麻黃各半湯主

之正二陽明病法多汗反無汗如蟲行皮中狀者此

久虛故也宜木附湯正七十黃耆建中湯正三十七



問自汗

答曰傷寒無汗者七證自汗者九證太陽傷寒剛瘧

病太陰病少陰病厥陰病陰易病冬陽明病皆無汗

凡少陰證無汗類麻黃湯之證然類麻黃證脉陰陽

俱緊少陰脉微細為異也又汗出為陽微故仲景云

陰不得有汗脉陰陽俱緊而汗出者九證衛不和自

舌人書

乙未一

四

漢書

平書集強
去書凡音
殊短初鳥
飛凡凡

漢書

汗病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者衛不和
 也先其時發汗則愈屬桂枝也正一太陽病發熱
 汗出者此為榮弱衛強故汗出欲救風邪者宜桂枝
 湯又云病常自汗出者此為榮氣和榮氣和者外不
 諧也以衛氣不共榮氣諧故爾以榮行傷風自汗
 脈中衛行脈外復發其汗榮衛和則愈傷風自汗
 病發熱汗出惡風脈緩為中風屬桂枝湯正一又云
 太陽病項背強凡凡反汗出惡風桂枝加葛根湯
 八主之汗出而渴者五苓散共六不渴者茯苓甘草
 湯正十三雖然仲景云傷風自汗用桂枝然桂枝湯難
 用須是子細消息之假令傷風自汗若脈浮而弱設
 當行桂枝服湯後無桂枝脈息證候而煩者即不可
 再服也若傷風自汗出而小便數者切不可與桂枝
 也仲景云太陽病自汗四肢拘急難以屈伸若小便
 難者可桂枝湯內加附子服之正六若小便數者慎
 不可與桂枝附子湯宜服芍藥甘草湯正五若誤行
 桂枝附子攻表便咽乾煩燥厥逆嘔吐作甘草乾姜
 湯正十五與之以復其陽若厥愈足溫更作芍藥甘草

音

定切

少

去聲

惡去聲灼

肯句如火

灼之熱也

斷音漢臥

息也傷

別本作中

一本作風

難去聲

喜音戲中

音泉弱音

謂

燥音端新

音硬

湯與之其脚即伸若胃氣不和譏語者與調胃承氣

湯西土微澹則止其譏語緣芍藥甘草湯主脉浮自

汗小便數者寸口脉浮為風大為虛風則生微熱虛

則兩脰掣小便數仍汗出為津液少不可誤用桂枝

宜服芍藥甘草補虛退風熱通風溫自汗太陽病發

治誤服桂枝湯後病證仍存者風溫自汗熱而渴不

惡寒者為溫病若發汗已身灼熱者名風溫風溫為

病脉陰陽俱浮自汗出身重多眠睡鼻息必紆語言

難屈萎瘁中濕自汗風濕相搏關節煩疼脉沉而細

湯難屈五中濕自汗汗出短氣小便不利難經云何

以知傷濕得之然當喜汗出不可止何以言中暑自

之腎主濕故知腎入心為汗出不可止也

汗太陽中熱者渴是也其人汗出陽明病自汗不惡

惡寒身熱而渴屬白虎湯吳古陽明病汗出多

而渴者不可與五苓散以汗多胃中燥猶苓復利其

小便故也故仲景云陽明病發熱汗多者急下之陽

明病其人汗多以津液外出胃中燥大便秘譏語

活人書

九卷

五

喉音禁寒
而口閉

顯音厄
逆氣和也

者屬調胃承氣湯正四三雖然陽明汗多急下若小便
自利者此為津液內竭雖爾不可攻之須自大便導
之宜用蜜煎導法正五陽明病汗出而脈遲微惡寒
者表未解也宜桂枝湯正一陽明法多汗則脈浮無
汗而喘者發汗則亡陽自汗止太陽病發汗多遂漏不
愈宜麻黃湯正二十一亡陽自汗止其人惡風當溫其經
宜桂枝加附子湯正六傷寒尺寸脈俱緊而汗出者
亡陽也此屬少陰法當啣痛而復吐利其人熱不去
內拘急四肢厥逆而惡寒者四逆湯正五主之汗
多不止者可用溫粉撲之若汗多不止必惡風煩躁
不得臥者先服防風白朮桂柔瘥自汗止太陽病發熱
嘔湯進火服小建中湯正七柔瘥自汗止太陽病發熱
口噤背反張汗出而不惡寒者霍亂自汗止利汗出
名柔瘥小續命湯主之也雜五七霍亂自汗止發熱惡寒
四肢拘急手足厥冷雖然少陰不得有汗而少陰亦
者四逆湯主之正五雖然少陰不得有汗而少陰亦
有反自汗出之證陰證四肢逆冷額上反手陽明病

有數種皆

邪氣所干

而然今言

病人表實

裏虛玄府

不開五內

乾枯胞中

空虛津液

少所致皆

非也外有

陽脫陰脫

二證又不

言及何以

○重虛之

法多汗而陽明亦有反無汗之證不可不察也



問頭汗出

答曰病人表實裏虛玄府不開則陽氣上出汗見於頭凡頭汗出者五內乾枯胞中空虛津液少也慎不可下下之者謂之重虛然頭汗出者有數證傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便秘脈細者此為陽微結必有表復有裏也脈沉亦在裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此為半在裏半在外也脈雖沉緊不得為少陰

重刊
音朝
戶

卷

懷機直

病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也

小柴胡湯主之傷寒五六日已汗下胃腸滿微結小便不

利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此表未解

也柴胡桂枝乾姜湯主之病人但頭汗出身無汗劑頸而還

小便不利渴飲水漿者此為瘀熱在裏身必發黃

散陽明病下之其外有熱手足溫不結胃

心中懊憹飢不能食但頭汗出者梔子豉湯主之心下緊

滿無大熱頭汗出者茯苓湯主之仲景云傷寒

此名為水結在胃胸以頭汗出別水結證小半夏加茯苓湯○陽明病下血譫

音戢和
也識音占
別本無下
之至主之
九字
內經仲景
並作頭痛
△作疼字
誤後倣此
惡去声片
何

語者此為熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而

愈汗出識語者有燥屎也過經乃可下也下之早語言必亂以表實裏虛故也下之愈宜承氣湯主之

問頭疼

答曰頭疼者陽證也太陽證頭疼必發熱惡寒無汗

者麻黃湯正二有汗者桂枝湯正一若已發汗或未

發汗頭痛如破者連翹蔥白湯雜五服湯不止者葛

根葱白湯主之雜七十六陽明證頭疼不惡寒反惡熱胃

實故也陽明氣實故攻頭也調胃承氣湯正四三主之

仲景云傷寒不大便六七日頭疼有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏續在表也當須發汗若頭疼

經旨

經旨

經旨

經旨

經旨

經旨

經旨

經旨

七

者必經屬桂枝湯正一 脉弦細頭痛發熱者屬少陽也少陽不

可發汗小柴胡主之 正廿九 太陰少陰經從足至胃俱

不至頭唯厥陰經挾胃屬肝絡膽循喉嚨上頰額連

目繫出額故太陰少陰並無頭疼之證仲景只有厥

陰一證吳茱萸湯 正一百 治乾嘔吐涎沫頭疼而已大

抵屬三陽者頭疼為多也 孫真人云陽傷寒者體熱

熱不頭痛是也 若并次頭疼胃中滿及發寒熱脉緊而不大

者即是商上有涎宜用瓜蒂末一錢暖水調下吐涎

立愈又問病人頭疼鼻塞而煩者何證也答曰此屬

中書錄
五編

濕家頭中寒濕故鼻塞而頭疼也內瓜蒂末鼻中則

愈法在發黃門中

問身體痛身痺附

答曰太陽少陰厥陰皆有身體痛當以外證與脉別

之太陽證表未解脉浮緊法當身體痛宜麻黃湯正

主以汗之脉浮緊當身體疼痛宜以汗解假令尺脉遲者不可發汗何以知其然榮氣不足血

少故也尺脉遲者先以小建中湯以養之正主脉浮者麻黃湯主之太陽中濕一身盡

痛發熱身黃小便不利病人中濕因而傷風風濕相

薄一身痛重是名風濕當於風濕中求之麻黃加木湯主之

古人言

發云

發上

發音

若脉沉自利而身體痛者陰證也急當救裏宜四

逆湯

正七十五

附子湯

正六十八

真武湯

百五

之類以溫之

抵

大便利而身體疼者當救裏大便秘如常而身體痛者急當救表不可不知也

或身重背強

腹中絞痛咽喉不利身如被杖者當作陰毒治之又

問發汗後身疼痛脉沉而遲當用何藥答曰仲景有

桂枝加芍藥生姜人參新加湯

正十一

盖為此證也小

建中湯

正三十七

兼治汗後身疼脉沉而遲者若霍亂吐

瀉止而身疼痛不休者少與桂枝湯

正一

即愈金匱

云瘡家雖身體痛不可發汗汗出作瘡又問身痒者

聖藥

湯音迷
首悸動也
靜其季切

何也答曰脉浮而遲遲為無陽不能作汗其身必痒
太陽病七八日脉微而惡寒以陰陽俱虛不可更發
汗更下更吐也小柴胡湯主之正二十若重反發汗則氣虛必兩耳聾無聞素無熱人可為藥甘草附子湯正七十二素有熱人可黃耆建中湯正三十七面亦有熱者未欲解也以其不能得小汗出身必當痒宜桂枝麻黃各半湯正

主之

主

問筋惕肉瞤頭眩身搖

答曰太陽病發汗不解發熱心悸頭眩身瞤動欲擗地者屬真武湯百五大凡發汗過多即身瞤動振擗

虛音標

少上而止
去聲去上

戶

虛音標

虛羸之人微發汗便有此證俱宜服真武湯羸甚者
去芍藥或少用之惡熱藥或有熱證者去附子餘依
本方加減法詳之傷寒若吐若下後心下逆滿氣上
衝胃起則頭眩脉沉緊發汗則動經身為振搖者茯
苓桂枝白朮甘草湯主之 正五二 傷寒應發汗而動氣
在左不可發汗發汗則頭眩汗出筋惕肉瞤此為逆
難治且先服防風白朮牡蠣散 雜二 次服建中湯 五三



問喘

答曰傷寒喘只有太陽陽明二證太陽病頭疼發熱

无去声

促音族速
也近也

示仲景作
亦近

加本無麻
黃主喘至
注之五十

身疼惡風無汗而喘者宜汗屬麻黃湯

正二十桂枝證
醫反下之利

遂不止脉促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩黃

連湯也正十九太陽病下之微喘者表未解故也桂枝

加厚朴杏子湯也正十九發汗後不可更行桂枝湯汗

出而喘無大熱者可與麻黃杏子甘草石膏湯也正二十

陽明病汗出不惡寒腹滿而喘有潮熱者宜下屬承

氣湯

正四十三然陽明病脉浮無汗而喘發汗則愈宜麻黃湯

正二十太陽與陽明合病

喘而胃滿者不可下宜麻黃湯又發汗後飲水多欬

而微喘者水停心下腎氣乘心故也小青龍去麻黃

加杏仁

正二十六

也小腹滿者去麻黃加茯苓也

正三十七麻
黃主喘

何故去之此治心下有水而喘不當汗也
小便不利小腹滿故去麻黃加茯苓也

若陰證喘

正之五十

正之五十

一

促脉伏而厥者唯返陰丹五味子湯主之



問渴

答曰脉浮而渴屬太陽

傷寒表不解心下水氣而渴者小青龍去半夏加栝蒌

根正王六太陽病服桂枝枝大汗出後大煩渴者白虎加人參湯若脉浮小便不利微熱消渴者五苓散正六六

太陽證身體灼熱而渴者

有汗而渴屬陽明白

為風溫括蕞根湯主之齋主

加人參湯主之虛人老人及春秋月可與竹葉石膏湯正九五陽明病但頭汗出小便不利渴飲水漿身必發黃宜茵陳湯正九十三陽明病脇下鞭不大便而嘔舌上白胎而渴者小柴胡去半夏加人參括樓根正九十九

傷風寒熱或發熱惡風而渴屬少陽

傷寒四五日身熱惡風脇下滿

手足溫而渴者小柴胡去半夏加人參括樓湯正廿九

自利而渴屬少陰

傷寒熱入於藏

難言硬

難言寸

按傷寒

引飲乃飲

情不白頭

渴以實

之及十一
去下利者
中重出自
利而渴條
却注云腎
虛故引水
白蠟通用
白通四逆
省本直武
等湯此若
以渴為熱
彼若以渴
為虛何耶
餘見下利
條按仲景
篇無汗無
表證者白
虎加人參
易其表不

流于少陰之經少陰主腎腎惡燥故渴而引飲少陰
下利欬而嘔渴者苓湯主之正六十七下利飲飲水者以
有熱也白頭翁
湯主之正百八○切戒太陽證無汗而渴者不可與
白虎湯仲景云渴飲飲水無表證者白虎加人參湯
意以小青龍小柴胡湯出仲景云傷寒表不解心下
有水氣咳而渴小柴胡湯去半夏加栝蒌也正三六傷
寒四五日身熱惡風脇下滿手足溫而渴陽明證汗
者小柴胡去半夏加人參栝蒌也正廿九陽明證汗
多而渴者不可與五苓散汗多胃中燥者五苓散復利其
之仲景云陽明病發作然太陽病渴終不可與白虎
有時汗出多者急下之
耶太陽證得汗後脉洪大而渴者方可與之也陽明
病渴終不可與五苓耶陽明證小便不利汗少脉浮

解者不可

活人書

九卷

二

與今不日

而渴者方可與之此皆仲景之妙法也

仲景猪苓湯證亦云脉浮

云無汗則

發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

正六七凡病非大渴不可與水若小

病汗出多

渴咽乾者小小呷滋潤之令胃中和若大渴煩躁甚

可與猪苓

能飲一斗者與五升飲之若全不與則乾燥無由作

湯今改作

汗發喘而死常人見因渴飲水得汗小渴遂劇飲之

五苓散何

致停飲心下滿結喘死者甚眾當以五苓散

正六或

作躁劇

陷胃丸

正三九

與之

金匱云得時氣至五六日而渴飲飲水不能多不當與也何者以腹

中熱尚少

不能消之便更為人作病矣至七八日大

渴欲飲水

猶當依證與之常令不足勿極意也凡人

但見仲景

云得病反能飲水此為欲愈遂小渴者乃

強飲之因

成其禍不可勝數大抵傷寒水氣皆因飲

平聲致上
 重其季
 切之噎音
 扶咽也逆
 氣也說也
 乞恬也肉
 則不敢噦
 噦噎音謁
 食氣不
 通亦作饑
 饑咽中
 音泉累
 上聲蓋
 楚辭切
 餉音胸中
 音泉
 按奉議公
 此卷言有
 次序非深

水過多所致水停心下氣上乘心則為悸為喘結於
 胃脇則為水結胃胃中虛冷則為嘔為噎為噎為噎
 則為噎上迫於肺則為咳清入腸中則為利邪熱所
 薄畜於下焦則為小便不利小腹滿或裏急後重
 膚則若陽毒倍常躁盛大渴者黑奴丸主之
 暑伏熱深累取不差其人發渴不已酒蒸黃連丸主
 之

雜十九



問鼻衄

答曰傷寒太陽證衄血者乃解蓋陽氣重故也仲景
 所謂陽盛則衄若脉浮緊無汗服麻黃湯
 不中
 病其人發煩目瞑劇者必衄小衄而脉尚浮緊者宜

正二十

于仲景者不能閉於許學士云活人書之意不可不審察夫何李知仙書指及吳恕指堂不知藥議言有次序定擬以麻黃桂枝二湯用之於衄後其誤人也深矣知仙徒知著書以濟人不

活人書

卷九

十二

再與麻黃湯衄後脉已微者不可行麻黃湯也若

脉浮自汗服桂枝湯正一不中病桂枝證尚在必頭

疼甚而致衄小衄而脉尚浮者宜再與桂枝也衄後

脉已微者不可行桂枝湯也大抵傷寒衄血不可發

汗者為脉微故也治法衄家不可發汗汗出額上陷

無汗而衄脉尚浮緊者須再與麻黃湯有汗而衄脉尚浮緩者須再與桂枝湯脉已微者黃

芩芍藥湯衄血不止者茅花

湯衄血不止者若衄而渴心煩飲則吐水先服五苓散正六

次服竹葉湯正五又問陰證有衄血者乎答曰陰證

知遠理而

得解即不
明仲景之
深意亦當
守戒之
極言固知
衲家亡血
家皆不可
汗復用麻
黃桂枝以
發之其吳
恕又從而
和之載之
指掌流瀉
天下其為
害也廣矣
以致我
明陶華無
知而妄作
於瑣言中

自無熱何緣有衄若少陰病但厥無汗強發之必動
血未知從何道出或從口鼻或從耳目是謂下厥上
竭為難治



問腹滿身重難以轉側口中不仁面垢
語遺尿

荅曰此三陽經合病也白虎湯主之

正六四

不可發汗

汗之則譫語下之則額上生汗手足逆冷若自汗者

白虎加人參也

正六五 按仲景篇若自汗出者白虎湯主之今三陽合病云云遺尿白虎湯

主之若自汗者白虎加人參也與仲景不同學者詳之

云以種枝麻
黃治如非治
雖也乃欲飲
其經中邪氣
耳此正東坡
所至交殺
人報仇其子
必行却非華
而誰曰不仁
別本作山中
不仁

活人書卷第九終

活人書卷第十

此一卷首論結胃與痞蓋病發於陽下之早卽爲結胃發於陰下之早卽爲痞然結胃與痞相似但以痛不痛爲異耳心下滿而鞭痛者爲結胃但滿而不痛者爲痞鑒家不審一有差互立致危殆結胃屬陷胃證痞屬瀉心證其詳各於逐問備論之矣



問心下緊滿按之石硬而痛

答曰此名結胸也傷寒本無結胸應身熱下之早熱

數去言
寒去言
皆瘕

卷之三

四十一

氣聚廬而入痞結不散便成結胸

若已誤轉了初未成結胃者急須與

理中湯正七十四

自然解了更不作結胃蓋理中治中焦

故也此古人亦說不到後人因消息得之若大段轉

損有厥證者兼與四逆湯正七十五便安胃中雖和傷寒

未退者即候目數足可下却以承氣再下之正四十二蓋

前來下得

未是故也

其證心下緊滿按之石硬而痛項強如柔

瘕狀

發熱汗出不惡寒名曰柔瘕

其脉寸口浮關尺皆沉或沉緊

名曰結胃也治結胃大率當下

仲景云下之則和

然脉浮與

大皆不可下下之則死尚宜發汗也

仲景云結胃脉浮者不可下只

可用小陷胃湯

正四十一

大抵脉浮是尚有衣證兼以小

柴胡湯等

正三十九

先發表表證罷方用下結胃藥便安

○西晉崔行功云傷寒結胃欲絕心鬲高起手不得

近用大陷胃湯

正三十八

皆不差者此是下後虛逆氣已

不理而毒復上攻氣毒相薄結於胃中當用枳實理

中圓

難全十二

先理其氣次療諸疾古今用之如神應手

而愈然結胸有三種有大結胃

不按其心下痛為小結胃大結胃大陷

胃丸主之

有小結胃

按之小陷胃湯主之

有水結在

胃脅間亦名結胃

頭微汗出但結胃無大熱此水結在胃脇證小半夏加茯苓湯

小柴胡去黃加牡蠣主之

又有寒熱二證有熱實結胃

胃中煩躁心內

懊憹舌上燥渴脉沉滑者皆熱證也大陷胃湯主之

有寒實結胃

寒實結胃無熱證者

三物白朮散

正三十八

理中湯丸主之

難八

近世治結胃多行金針丸用硫

黃陽起石者若寒實結胃行之或有差者若熱實結
胸行之必死也又問大陷胸湯與大陷胃丸如何大
陷胃用甘遂太峻不可輕用須量虛實輕重不得已
卽大陷胃丸最穩又問聖餅子灸臍中如何此丸不
可用也又問藏結者何也荅曰藏結者死仲景無治
法大抵藏結其證如結胃狀飲食如故時時下利陽
脉浮關脉小細沉緊名曰藏結舌上白胎滑者難治
也又云藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎
滑者不可攻也二者病人脇下舊有痞連在臍傍痛

九平声
引發於
陰非身冷
也即寒為
陰也陰邪
鬱榮服麻
黃湯不解
表邪傳裏
証象陽明
而脉浮緊
實者不達
而反下之
榮血重傷
而成痞滿
今云應身
冷何哉

引小腹入陰筋者亦名藏結死不治



問心下滿而不痛

荅曰此名痞也傷寒本無痞應身冷豎反下之遂成

痞枳實理中丸

維八一

最良

仲景治痞氣諸湯中有生
姜瀉心湯正六三半夏瀉心

湯正六二此二方
平和宜常用

仲景云滿而不痛者為痞柴胡不中

與也半夏瀉心湯主之

此湯藥味蓋本理中
人參黃芩湯方也

審知是

痞先用桔梗枳殼湯尤妙

維八三

緣桔梗枳殼行氣下

高先用之無不驗也結胃與痞關脉瀕皆沉若關脉

浮者大黃黃連黃芩瀉心湯

正五九

主之

關浮則結熱
三黃以瀉肝

活人書

六十卷

三

按開脉浮者為陽邪
 隨經入裏
 今注云結
 熱瀉肝蓋
 熱結則成
 結胃非痞
 也况心下
 正屬中焦
 開脉亦主
 中部故湯
 瀉心豈可
 援雜病脉
 側以左關
 為肝部謂
 之瀉肝耶
 綜言燥乾
 心噫音陸

若復惡寒汗出者附子瀉心湯 正六十一 主之病人心下

痞與瀉心湯痞不鮮發渴口燥煩小便不利者五苓

散 正六十六 主之汗出表解而胃中不和心下痞鞭乾噫

食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主

之 正六十三 下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭

而滿此以醫下之也若復下之其痞益甚甘草瀉心

湯主之 正六十二 蓋此非結熱以胃中虛客氣上逆故使

鞭也下利而心下痞服生薑瀉心湯甘草瀉心湯利

不止者當治其下焦赤石脂禹餘糧湯主之 正六十九 蓋

紅雲

生薑

仲景

陷胸

落之

大猛

又况

心下

不痛

不痛

今言

下之

何耶

變宜

生薑瀉心甘草瀉心皆治中焦此利在下焦若只治

中焦則利益甚耳服赤石脂禹餘糧湯利復不止當

利其小便五苓散主之凡痞服瀉心湯不愈然後可

用陷胃丸正五下之不可用陷胃湯蓋太猛只用陷胃丸大抵結胃與

痞皆應下然表未解者不可攻也仲景云當先解表

表解乃可攻痞解表宜桂枝湯正一攻痞宜大黃黃

連黃芩湯正五外證未解心下妨悶者非痞也謂之

小柴胡湯加乾姜支結柴胡桂枝湯主之若太陽證未除而數下之遂協熱

而利利不止心下痞鞭表裏不解者桂枝人參湯主

活人書 十卷 四

之

正十六

十棗湯

正八九

大柴胡湯

正三十

皆治心下痞此

方尤難用須是表證罷不惡寒身涼其人熱熱汗出

發作有時頭疼心下痞鞭滿引脇下疼乾嘔短氣者

乃可行十棗湯表未解者慎不可用也大柴胡湯治

傷寒發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐而下利者非大

柴胡湯不可也

正三十一

若發汗吐下後心下痞鞭噫氣

不除者旋復代赭湯主之

正百十一

有旋復代赭湯證其

人或咳逆氣虛者先服四逆湯

正七十五

胃寒者先服理

中丸

正七十四

次服旋復代赭湯為良

旋覆花代赭湯是解後心下痞鞭證

太

問嘔者乾嘔所

苓曰無陽則厥無陰則嘔嘔者足陽明胃之經足陽明之氣下行今厥而上行故爲氣逆氣逆則嘔仲景云嘔多雖不大便不可下可與小柴胡湯正廿九上焦

得通津液得下胃氣因和浹然汗出而解大抵嘔證不一各有治法要之小柴胡湯尤相主當耳與小柴胡湯胃腸滿而嘔日晡發潮熱者可與小柴胡湯加

芒硝也

正三十四

若嘔不止心下急鬱鬱微煩者與大柴

胡湯也

正三十三

大便秘者方加大黃

太柴胡治嘔最妙爲內有枳實故也

枳實去穢壓虛氣須是去大黃仲景云嘔多難有
明證慎不可下官局桂枝湯最良亦用枳實耳方具
第十卷 古人治嘔多用半夏生薑孫真人云生薑是嘔

家聖藥仲景治嘔皆用之 太陽與陽明合病必下利
若不利但嘔者葛根加半

夏生薑湯主之 正三十一 胃中有熱胃中有邪氣腹痛欲
嘔者黃連湯主之 正三十三 太陽與少陽合病而自利若

生薑湯主之 正六十六 金匱諸嘔吐穀不得下者小半夏

湯小半夏加茯苓湯 正六十九 小半夏加橘皮湯皆可選

用也嘔而發熱者小柴胡湯主之 正七十九 嘔而發渴者

猪苓湯主之 正八十七 先嘔却渴者此為欲解急與之水

先渴却嘔者為水停心下此屬飲家仲景云本渴飲

飲如常

差楚懈切
 腔音管
 按嘔者声
 物兼出者
 也今云嘔
 者飲食不
 下何邪又
 嘔與噦盖
 字異而音
 義俱同者
 也乾嘔音
 其声輕小
 而短噦者

水而嘔者柴胡不中與也宜治鬲間有水赤茯苓湯

主之雜八十四若少陰證而嘔者真武湯去附子加生薑

也正百五十五若汗若吐若下後虛煩不得眠若嘔者梔子

生薑湯正百五十七主之傷寒差後嘔者有餘熱在胃腕竹

葉湯加生薑主之正六十五又問有乾嘔者何也答曰大

凡嘔者飲食不下乾嘔者今人所謂呃也或因汗出

或因有水或因下利脾胃有熱故使乾嘔官局中結

梗湯最佳雜百廿二仲景治法汗自出乾嘔者桂枝證也

正表不解心下有水氣乾嘔發熱者小青龍也正

手入青

其方濁惡

而長雖係

証却有

微甚之殊

今云所謂

久而不叙

証則有

六經重矣

其身涼汗出兩脇痛或乾嘔者十棗湯也正六十九少陰

下利脉微與白通湯正九十七利不止厥逆無脉乾嘔煩

者白通加猪膽汁湯也正六十八少陰下利裏寒外熱脉

微欲絕或乾嘔者通脉四逆湯也正六十二乾嘔吐涎沫

頭痛者吳茱萸湯也正一百傷寒論云食穀欲嘔者屬

劇者屬上焦也仲景無治法大抵吳茱萸湯治少陰

證也穀入胃而嘔屬陽明宜與小柴胡湯正二十九

○若病人直患嘔吐而復脚弱或疼乃是脚氣當作

脚氣治之
問吐

仲景以
本因寒下
醫復吐下
因成寒格
吐証故用
此湯今却
言關脉遲
又不言吐
下而言汗
下何耶又
有脉數為
胃中虛冷
而吐者仲

答曰吐有冷熱二證寸口脉數手心熱煩渴而吐以

有熱在胃脘五苓散主之

正六十六傷寒有表證渴欲飲水也水入口即吐者名曰

水逆由心經受熱而小腸不利故也宜服五苓散發汗後水藥不得入口為逆若更發汗必吐下不止小半夏加茯苓湯大半

夏加橘皮湯主之曾經汗下關脉遲胃中虛冷而

正百七

寒多不飲水而

吐者理中湯去朮加生薑主之

正七十四

少陰病飲食入

口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脉

弦遲者此胃中實不可下也當吐之若膈上有寒飲

乾嘔者不可吐也當溫之宜四逆湯

正十五

吐利手足

景書言之
美厥吳証
向何不引
之以為診
續之別

逆冷煩燥甚者吳茱萸湯主之正二百若傷寒解後虛

羸少氣氣逆欲吐竹葉石膏湯主之正五百



問嘔吐而利

答曰嘔吐而下利有兩證仲景云傷寒發熱汗出不

解心中痞硬嘔吐而下利者大柴胡湯下之正五百又有

霍亂證霍亂嘔吐而利熱多而渴者五苓散正六百寒

多不飲水者理中丸正七百或有寒腹痛滿或四肢拘

一作救生用並龔未吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手

足厥冷者四逆湯主之正七百五少陰病吐利手足逆冷

煩燥欲死吳茱萸湯主之

正一百

吐利止而身體痛不

休者當消息和解其外宜桂枝湯

正三仲景大柴胡一證云傷寒發熱汗

出不解心中痞嘔吐而下利者大柴胡主之即非霍亂也吐利已汗出而厥四肢

拘急不解脉微欲絕者通脉四逆加猪膽湯

正三

若夏

月中暑霍亂上吐下利心腹撮痛大渴煩躁四肢逆

冷冷汗自出兩脚轉筋宜服香薷散

正五

須井中沉冷

極冷頓服之乃効

香薷散夏月預宜合下以備此證其他藥不能收仍須極冷併服之

全

問咳嗽

答曰傷寒咳嗽有兩證有太陽證咳嗽小青龍湯

正三

十六 小柴胡也有少陰證咳嗽真武湯 二百五 四逆散 二百

十七 猪苓湯也大抵熱在上焦其人必飲水水停心下

則肺爲之浮肺主於咳水氣乘之故咳而微喘仲景

云傷寒表不解心下有水乾嘔發熱而咳小青龍湯

主之小便不利小腹滿者去麻黃加茯苓 二百三十六 往來

寒熱胃脇滿痛或咳者小柴胡湯主之小柴胡去人

參大棗加五味子乾薑 二百三十九 若少陰證咳嗽四肢沉

重疼痛小便不利自下利而咳真武湯主之真武湯

加五味子乾薑大抵傷寒水氣皆因飲水過多古人

製本作洪

治水氣而咳者病在陽則小青龍主之病在陰則真武湯主之四肢厥逆腹中痛或泄利而咳四逆散主之四逆散加五味子乾薑臣士大下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠猪苓湯主之臣士大古今錄驗橘皮湯治嗽佳



問咽喉痛

答曰咽喉痛有陰陽二證脉浮數面赤斑斑如錦文咽喉痛唾膿血者此陽毒也脉沉遲手足厥冷或吐利而咽中痛此少陰證也病源云此爲下部脉都不

至陰陽隔絕邪客於足少陰之絡毒氣上衝故咽喉不利或痛而生瘡也傷寒脉陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利此候汗下熏熨俱不可汗出者藁本粉傳之咽喉痛者甘草湯五十四

桔梗湯

正百二十

猪膚湯

正百一

半夏散

正百三

通脉四逆去

芍藥加桔梗湯

正六十一

麻黃升麻湯

正三十五

可選而用之

又有伏氣之病謂非時有暴寒中人伏氣於少陰經始不覺病旬月乃發脉微弱法先咽痛似傷寒非喉痺之病次必下利始用半夏桂甘湯正五十三次四逆散

懸譯四逆
重不主四

總四逆
病利誤也
楊仁希亦
作湯
按津液枯
少固也然
非獨脾藏
有熱脾主
太陰太陰
腹滿而嘔
乾此可
脾熱特一
証耳餘皆
非也

主之

正七十六

此病只一二日便差古方謂之腎傷寒也



問口燥咽乾

答曰脾藏有熱則津液枯少故令口燥而舌乾仲景

云傷寒無大熱口燥渴而煩背微寒者白虎湯加入

參也

正六十五

又云陽明病渴欲飲水口乾舌燥者白虎

加入參湯主之

正六十五

若咽乾者慎不可發汗發汗則

重亡津液少陽證口苦咽乾者小柴胡主之

正九十九

少

陰證口燥咽乾者急下之病人默默欲眠目不能開

起居不安其聲啞或咽乾者當作狐惑治之

金

問病人但漱水不欲嚥

答曰陽明病頭疼身熱口燥但漱水不欲入咽者必
衄也若病人無表證不發寒熱胃腹滿唇燥但欲漱
水不欲嚥者此為有瘀血必發狂也輕者犀角地黃

湯

八十六

甚者抵當湯

正九十一

陽明病其人喜忘者必有蓄血所以然者本有久瘀血故

令喜忘屎雖鞭大便秘反易其色必黑者宜此藥下之
假令已下病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者
可下之假令已下脈數不解合熱則消穀善飢或太
陽病身黃脈沉結小腹鞭小便不利者無血也小便
自利其人如狂者血證諦也至六七日
不大便者有瘀血也宜服此藥屬陽明

金

問不欲眠

荅曰太陽證發汗大汗出胃中乾煩燥不得眠欲飲

水者當少少與之胃中和即愈若脉浮小便不利發

渴者五苓散

正六

主之下後復發汗晝日煩燥不得

眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者

乾薑附子湯主之

正十三

若發汗若吐若下後虛煩不

得眠劇則反覆顛倒心中懊憹者宜梔子豉湯

正五

吐之

梔子豉湯一盞半爲一劑分再服一服得吐止後服

傷寒大熱乾嘔呻吟

錯語不得眠黃連解毒湯主之

經八十七

傷寒吐下後心

煩之氣晝夜不得眠酸棗湯主之

雜六

少陰病得之

二三日已上心中煩不得眠黃連阿膠湯主之

雜百七

若少陰病下利而渴不得眠猪苓湯主之

正六七

又問

傷寒差後不得眠何也蓋熱氣與諸陽相并陰氣未復所以病後仍不得睡也梔子烏梅湯主之

雜九



問多眠

答曰多眠有四證有風溫證有小柴胡證有少陰證有狐惑證病人尺寸脉俱浮頭疼身熱常自汗出體重其息必喘四肢不收默默但欲眠者風溫證也風溫不可發汗宜萎蕤湯

雜四十五

○病人脉浮頭項強痛

而惡寒者太陽證也十日已去脉浮細而嗜臥者外

已解也設胃滿脇痛者與小柴胡湯正十九脉但浮者

麻黃湯主之正二十一病人尺寸脉俱沉細但欲寐者少

陰證也急作四逆湯正七十五復其陽不可緩也若狀如

傷寒四肢沉重忽忽喜眠須看上下唇上唇有瘡

蝕五藏下唇有瘡虫蝕下部當作狐惑治之



問身凉汗出兩脇疼痛或乾嘔

答曰此十棗湯證也仲景云太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出發作有時頭痛心中

痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解
裏未和也十棗湯主之（五六）○大抵脇下痛者此爲
有飲須分表裏乾嘔微利發熱而咳爲表有水小青
龍湯加芫花主之（五十六）身體涼表證罷乾嘔而脇下
痛爲裏有水十棗湯主之十棗湯非小青龍湯之比
須量人虛實不可妄投

活人書卷第十終

以吃逆與
或逆呼之
然欬逆二
字僅見難
脈平脈法
中其餘篇
但有噦而
無咳逆後
人遂謂噦
即欬逆而
曰欬逆者
噦逆之名
由是噦與
欬逆之名
幾無二仲
景全遺法

活人書卷第十一

此一卷首論咳逆傷寒咳逆此證極難仲景經中
不載孫真人云咳逆遍尋方論無此名稱深窮其
狀咳逆者噦逆之名蓋古人以咳逆為噦耳大抵
咳逆者古人所謂噦是也噦者今人所謂乾嘔是
也

問咳逆

苓曰咳逆者仲景所謂噦者是也噦逆氣也胃寒所生
傷寒本虛攻其熱必噦又云傷寒大吐下之極虛復

口開而汗出者
與同類者
言何曾指
欬逆言乎
欬逆言其
語發聲于
喉間則還
然止軋然
連續數聲
然而短促
不長有若
欬嗽之欬
然故曰欬
逆藏逆者
則言其似
欲嘔物以
出而無所
但逆之

發汗者其人外拂鬱復與之水以發其汗因得噦所

以然者胃中寒故也橘皮乾薑湯雜九十一羌活附子散

雜九十二半夏生薑湯雜九十三退陰散主之雜九十四若服藥不

差者灸之必愈其法婦人屈乳頭向下盡處骨間灸三壯丈夫及乳小者以一指為率正

也男左女右艾炷如小豆許與乳相直間陷中動脉處是然亦有陽證咳逆者小

柴胡湯正二十九橘皮竹茹湯雜五仲景又云傷寒臑而

腹滿視其前後知何部不利利之即愈仲景無方前部宜猪苓湯

正六十七後部宜調胃承氣湯正四十三扁鵲中藏經治傷寒咳逆丁香散丁

香柿蒂各一分甘草良薑各半錢沸湯點作一服乘

力直至
 承而後
 非如乾
 之輕而
 甚故曰
 以逆今乃
 以順逆當
 以逆何耶
 以吃音吉
 百押
 非當小
 柴胡湯解
 之

熱猛喫極効三因第十一卷又有竹茹湯等方亦下
 香散方竹茹湯治陽證也本事方第八卷治傷寒候
 咳逆豆蔻湯治陰證咳逆丁香茴香肉豆蔻等藥若
 陽證不可用凡咳逆多有先熱而喫生冷或涼藥多
 相激而成蓋陰陽二氣相搏林人之僕本發大熱以
 涼藥下之想太甚咳逆四五日竟至於服丁香柿蒂
 而后却再以小柴胡之屬解其餘熱遂愈下后蓋有
 身熱不解治傷寒咳逆後二方出撫州華蓋山周氏
 生惟一備急方救急方香附子橘核各半兩細剉用

補諸起至
下五圓止
隨本俱無
論議不
煩諸條係
後人所增
姑存之以
俟

酒半盞先將藥在石銀器內炒漸漸滴酒炒藥焦
色研細末每二錢水一小盞煎至八分細細旋
一方單用香附子末又方大蒜頭二箇煨動研爛
白薑末丸得為度研和如梧桐子大搗薤菜自然汁吞下
二十圓病退再服一十五圓



問發黃

答曰病人寒濕在裏不散熱畜於脾胃腠理不開瘀
熱與宿穀相薄鬱蒸不消化故發黃漢贊南方暑濕近夏瘴熱蓋瘴
者黃也古人以黃為瘴溫熱相薄民多病瘴甚為附腫然發黃與瘀血外證及

脉俱相似但小便不利為黃小便自利為瘀血要之
發黃之人心脾蘊積發熱引飲脉必浮滑而緊數若
瘀血證即如狂大便必黑此為異耳凡病人身體發
熱頭面汗出身無汗劑頸而止渴引水漿小便不利
如此必發黃茵陳蒿湯正九十三加五苓散正六十六也茵陳蒿湯

十分五苓散五分二件拌和病人服湯得小便利如

皂莢汁赤一宿腹減則黃從小便中出也古人云治

濕不利小便非其治也大抵發黃者瘀熱在裏梔子

蘗皮湯正五十一麻黃連翹赤小豆湯正三十四可選而用之

又方傷寒欲發黃者急用瓜蒂末口含水搐一字許
入鼻中出黃水甚驗卽用茵陳蒿湯調五苓散服之
最良又問白虎證亦身熱煩渴引飲小便不利何以
不發黃荅曰白虎與發黃證相近遍身汗出此爲熱
越白虎證也頭面汗出頸已下都無汗發黃證也又
問太陽病一身盡痛發熱身如熏黃者何太陽中濕
也仲景云傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕
在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之
第六卷第
十又問病人脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛

又按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時咳嗽者何也答曰少陽中風也小柴胡湯主之

匡氏



問發狂

答曰發狂有二證陽毒發狂畜血如在其外證與脉皆不同病人煩燥狂走妄言面赤咽痛脉實潮熱獨語如見鬼狀此陽毒也病人無表證不發寒熱唇燥但欲漱水不欲入咽其脉微而沉小腹鞭滿小便反利大便必黑身黃發狂此血證諦也

病人加熱狀煩滿口燥其脉反

無熱此為陰伏其血證審矣仲景云太陽病不解熱結膀胱其人如狂其血自下者愈若外不解者尚未可攻當先解其表宜桂枝湯正一外已解但小腹急結者乃可攻之屬桃仁承氣湯主之正四大抵

傷寒當汗不汗熱畜在裏熱化為血其人喜忘而如

狂血上逆則喜忘血下畜則內爭甚者抵當湯正九十二

抵當圓正九十輕者桃人承氣湯正四十四犀角地黃湯正

法須取盡黑物為効失汗熱畜在膀胱經若用抵當湯更須子細審其有無表證若

有畜血證而外不解亦未可使用抵當湯先用桂枝湯以解其外緣熱在膀胱太陽經故也又有

火邪發驚狂者鑿以火於臥床下或周身用火迫切

汗出或熨而成火邪其人亡陽煩躁驚狂卧起不安

機華佗云
 新發未入
 于胃而下
 之胃虛熱
 入爛胃又
 熱已入胃
 不以時下
 之熱不得
 泄亦胃爛
 其斑如鴉
 六微隱

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯 正十 桂枝甘

草龍骨牡蠣湯 正十四 主之 凡灸及燒針後証似火劫者並用翕法治之金匱風

引湯尤良柴胡加龍
 骨牡蠣湯更捷 正十三

問發斑

答曰發斑有兩證 溫毒發斑 熱毒發斑 溫毒發斑者冬月觸冒

寒毒至春始發或已發汗吐下表證未除毒氣未解

故發斑黑膏主之 難九十三 或冬月溫暖人感乖戾之氣

至春初為積寒所折毒氣未得泄迨天氣暄暖溫毒

始發肌肉斑爛癰疹如錦文而咳心悶嘔清汁葛根

尺者兩
 今云表
 風寒實熱
 毒乘虛仲
 景論何曾
 有此証治
 哉王胡奉
 云服熱藥
 過多亦發
 斑素炬云
 陽毒出斑
 皆如火跡
 者面大青
 果並不免
 于死者胃
 爛故也故
 人或謂斑
 有生者非
 汗也皆疹

橘皮湯維九十四 屢用之驗黃連橘皮湯亦佳維百一五廣州

如壞熱病發斑者與時氣發斑同或未汗下或已汗

下熱毒不散表虛裏實熱毒乘虛出於皮膚遂發斑

瘡癰疹如錦紋俗呼麩瘡素問謂之疹發斑者下之

虛入胃故也下之太遲熱留胃中亦發斑服熱藥過

多亦發斑微者赤斑出五死生劇者黑斑出十死

一大抵發斑不可用表藥表虛裏實若發其汗重令

開泄更增斑爛也皆當用化斑湯維百九 玄參升麻湯

阿膠大青湯維九十六 豬膽梔子湯醫四十四 或與紫雪

大妙可下者與調胃承氣湯五十四 暑月陽氣重者常

其狀如
蚤咬小
急治之
無而亦是
也故多生
矣今此瘰
疹如錦文
者疹也非
斑也以斑
即是疹亦
非也如上
所言豈特
兩証乎

蚤咬却
急治之

又有陽毒發斑見四卷二問四問宜參酌之



問識語

答曰病人有識語有鄭聲二證鄭聲為虛當用溫藥

白通湯主之

臣九十七

識語為實當須調胃承氣湯主之

臣九十三

服調胃承氣而識語止或更衣者停後服不爾

再與之仲景云實則識語虛則鄭聲鄭重也重語也

世多不別然識語鄭聲亦相似難辨須更用外證與

脉別之若大小便利手足冷脉微細者必鄭聲也大

便秘小便赤手足溫脉洪數者必識語也以此相參

然後用藥萬全矣大抵傷寒不應發汗即讖語仲景云傷

寒四五日脉沉而喘滿沉為在裏反發其汗讖語屬

津液越出大便為難表虛裏實實則讖語

胃和中則愈不和則煩而躁宜調胃承氣湯然亦有

三陽合病讖語者三陽合病腹滿身重難以轉側口

實不可汗下宜有胃實讖語者病人身熱汗出大便

白虎湯正六四或發汗多亡陽讖語者景

氣湯正三三大承氣正四外

臺承氣湯無芒硝尤穩胡桂枝湯正三三和其榮衛以通津液後自愈恐人作

燥屎攻之慎有下利讖語者下利讖語有燥屎也調

不可攻也湯主之有下後讖語者傷寒八九日下之胃滿煩驚

齒三

廉伯按
臨期理論

側者柴胡加龍
骨牡蠣湯正三十三有婦人熱入血室讖語者婦人傷寒發熱經水

適來晝日明了暮則讖語如見鬼狀者比為熱入血

室無犯胃氣及上二焦速用小柴胡湯治之正三十九若

行湯遲熱入胃令津燥中焦上焦不榮成血結胃狀

須當針期門也婦人中風發熱惡寒經水適來七八

日熱除脉遲身躁胃脇下滿如結胃狀讖語者此為

熱入血室也常刺期門隨其實而取之已上二焦熱

結在期門也若犯胃氣晝夜讖語喜忘

小腹滿小便利屬抵當湯證也正九十二○又問仲景

云無犯胃氣何也答曰熱因經水適來乘虛入室故

血室有熱遂令讖語當以小柴胡解之正二十九即與胃

實讖語不同胃實有燥糞故宜調胃承氣湯下之正

十三若血室有熱讖語非胃家實仲景恐人作胃實攻

舌人書
四十一
七

之故曰無犯胃氣也大抵讖語是熱屬陽而反見陰證者逆

三

問吐血

答曰傷寒吐血由諸陽受邪熱初在表應發汗而不發汗熱毒入深結於五臟內有瘀積故吐血也瘀血

甚者抵當圓

正九十

輕者桃人承氣湯

正四十四

兼服犀角

地黃湯

雞六十六

三黃圓

雞八九

四

問腹痛

腹脹滿附

答曰本太陽病豎反下之因爾腹滿時痛是有表復

云
加大
湯主之
乃胃中邪
實結燥而
痛今云痛
甚則與大
實證全別
云

有裏仲景所以用桂枝加芍藥湯主之

正十三痛甚者

加大黃

正十三桂枝加芍藥即是小建中也太陰脉弱

陽氣易動故也下利難經云痛為實大抵痛宜下

云發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯正四十二又曰腹中滿痛此為實當下之屬大柴胡湯正三十一腹

痛有二證有熱痛有冷痛尺脉弦腸鳴泄利而痛者

冷痛也小建中湯主之

正十七

仲景云陽脉清陰脉弦

法當腹中急痛先與小建中湯不差者與小柴胡湯

小柴胡去黃芩

陰證腹痛即四逆散

正七十六

通脉四逆

加芍藥湯

正八十二

腹痛小便不利者真武湯

正百五

閉脉

實腹滿大便秘按之而痛者實痛也桂枝加大黃湯

正十二黃連湯正八三大承氣湯主之正四十二○又問腹脹

滿者何也陰陽不和也桔梗半夏湯最良經九十九仲景

論太陽證發汗後腹脹滿也厚朴生薑半夏甘草人

參湯正五十八下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯

正四十八吐後腹脹滿者與調胃承氣湯正四十三少陰病六

七日腹脹不大便者急下之宜承氣湯正四十三



問煩躁

答曰傷寒煩躁太陽與少陰經為多蓋太陽與少陰陽

陰為表裏

明經或因不大便中有燥屎故煩躁耳

仲景云病人不大便五六

日遶臍痛煩躁發作有時者此有燥屎也宜承氣湯大抵得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下鞭小便利尿定鞭以小承氣湯五十三少少與微利之然有病已差尚微煩必大便鞭當問其小便日幾行若小便少津液當還人胃不須攻也大抵陰氣少陽氣勝則熱而煩故

太陽經傷風多煩而躁也

仲景云太陽傷風服桂枝湯正一煩不解先刺風池

風府却與桂枝湯又云太陽傷風脉浮緊發熱惡寒身疼痛無汗而煩躁者大青龙湯主之五十五又云傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之五十七又云傷風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐五苓散主之五十六又云傷寒得病無熱但狂言煩躁不安精氣不與人相當但與五苓散二大錢服之當與新汲井水飲一升許卽以指刺喉去之隨手愈然而太陽證自汗心煩若小便數者又不可用

桂枝表也陽虛陰盛亦發煩躁陽氣弱為陰所乘而躁故

少陰病亦煩躁少陰病二三日已上心煩不得卧者連阿膠湯主之

足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

利咽痛胃滿心煩者猪膚湯主之

七日欬而嘔渴煩不得眠猪苓湯主之

惡寒而踈時時自煩欲去衣被大柴胡下之

學者當以外證與脉別之寸關浮數身熱而煩者屬

逆自利而煩者屬少陰也然有汗之而煩者仲景云太陽病發汗

躁不得眠欲得飲水者少與之令胃中和則愈

若脉浮小便不利微熱消渴五苓散主之

有

下之而煩者仲景云下之後發汗晝日煩躁不得眠

乾薑附子湯主之

又云發汗吐下後虛煩不得眠心中懊憹者梔子豉湯主之

正四十五發汗若下之病

人不解煩躁者茯苓
四逆湯主之正六又有病已解而反微煩者此由

病新差不勝穀損穀則愈
先用小柴胡湯正九和其
榮衛以通津液得尿而解

小柴胡不中然後以
調胃承氣湯正四十三



問下利者

答曰傷寒下利多種須辨識陰陽勿令差互
三陽下利則身

熱太陰下利手足溫少陰厥陰下利身不熱以此別
之大抵下利挾太陽脈證便不得用溫藥俗聖但見

下利便作陰證用溫熱藥
鮮不發黃生斑而死也 太陽陽明合病必下利葛

根湯正二十六主之
下利而頭疼腰痛肌熱目疼鼻乾其脈浮大而長者是其證也 太陽

少陽合病自下利黃芩湯主之
正八十五若嘔者黃芩湯

加半夏生薑也

正土下利而頭疼胃滿或口苦咽乾或性來寒熱而嘔其脉浮大而弦者

是其證也陽明少陽合病必下利其脉不負者順也負者

失也互相尅賊名為負也

下利而身熱胃脅病滿乾嘔或性來寒熱其脉長大

而弦者是其證也蓋陽明者土其脉長大少陽者木其脉弦若合病土被木賊更下利為胃已困若脉不

弦者順也為土不負負者死

自利不渴屬太陰

四逆湯主之正土

利而渴屬少陰

白通湯正土白通加猪膽湯正土通脉四逆湯正土猪苓湯正土真武湯

正百五四逆加人參湯其餘下利皆因汗下後證也大

抵傷寒下利須看脉與外證下利而脉大者虛也脉

微弱者為自止下利日十餘行脉反實者逆下利脉

別本心陷下有注云腎虛致引水自救通用九字○按白通四逆猪苓真武等湯前九氣湯證春中自利而得條下正云傷寒

入于少陰
 之經少陰
 主腎腎經
 經故渴而
 引飲以渴
 為熱此以
 為虛又具
 分證兩門
 初學檢閱
 疑誤豈小
 今詳定少
 陰欬而下
 利嘔渴及
 欬陰下利
 欲飲者是
 皆傳經之
 邪熱脈必
 沉細故

數而滑者有宿食也下之愈脉遲而滑者實也其利

未得便止更宜下之下利三部脉皆平按其心下硬

者急下之協熱利者臍下必熱大便赤黃色及腸間

津汁垢膩謂之腸垢寒毒入胃則臍下必寒腹脹滿大便

或黃白或青黑或下利清穀濕毒氣盛則下利腹痛

大便如膿血或如爛肉汁也下利欲飲水者以有熱

也下利譫語者有燥屎也寒毒入胃者四逆湯臣法

理中湯臣法白通湯加附子臣法四逆散加薤白臣法

主之協熱利者黃芩湯臣法白頭翁湯臣法三黃

十六
 十八
 十八
 十八

以連滑等
清利之其
或少陰自
利而渴欲
吐不吐心
煩但欲寐
是直入本
經之陰邪
也脉必沉
微故以姜
附等溫之
倘不如比
明不脉証
合而喘一
門而分辨
之庶一見
而兩得焉
消之濕之
變其攸利

熟艾湯 雜百 薤白湯 雜百 赤石脂圓 雜百二 濕毒下癰

血者桃花湯 正九十九 地榆散 雜百三 黃連阿膠散 雜百四 雖

然自利而渴屬少陰然三陽下利亦有飲水者乃有

熱也三陰下利宜溫之然少陰自利清水心下痛口

乾燥者却宜下之此又不可不知也 少陰泄利下重

濃煎薤白湯雜百內四逆散緣四逆散用枳實芍藥

之類又尋常胃中不和腹中鳴下利生薑瀉心湯



問小便不利小便難

谷曰傷寒發汗後汗出多亡津液胃中極乾故小便

大傾藥錄
之有

不利豎見小便不利往往利之誤矣類纂云胃中乾

則無小便慎不可利故仲景云下之後復發汗小便

不利者亡津液耳若傷寒引飲下焦有熱小便不通

脉浮者五苓散正六十六脉沉者猪苓湯也正六十七表不解

心下有水發熱而咳小腹滿小便不利者小青龍湯

去麻黃加茯苓也正三十六傷寒無汗翕翕發熱頭項強

痛小便不利者桂枝湯去桂加茯苓白朮也正方嘔

而發熱胃脇滿心下怔忡小便不利者小柴胡湯去

黃芩加茯苓正二十九少陰病小便不利者四逆散加茯

苓

苓也

四十六便寒有所不利者行之取其滲泄也有渴而飲停者有躁而煩渴者有病氣去而水氣不

得行者其表裏得見煩躁口燥欲飲水水入即吐病

名水逆及霍亂頭痛發熱身疼痛欲飲水者有發熱

汗出復惡寒不嘔但心下痞者並宜五苓散其脉浮

發熱渴欲飲水小便不利少陰病下利六七日欬而

咽渴心煩不得眠者宜與猪苓湯其大病差後從腹

已下有水氣者牡蠣澤瀉散五十四此利水道滲洩之

也義大抵中濕與發黃以利小便為先陽明汗多以利

小便為戒○又問小便難何也陰虛故也陰虛者陽

必湊之為陽所湊也故小便黃者中有熱也宜瞿麥

滑石之類瀉之太陽病發汗遂漏不止其人惡風小

便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之五十五

便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之

六陽明中風脉弦浮大短氣腹滿脇下及心痛鼻乾
不得汗嗜卧身黃小便難潮熱而噦者小柴胡加茯苓
主之正十四

六

問小便自利小便數

答曰太陽證下焦有熱小腹必滿應小便不利而小
便反利者下血證也抵當湯主之正十四陽明證自汗

出應小便少而小便自利者津液內竭也尿雖硬不
可攻也當用蜜煎導之正十四少陰證四逆而小便自
利者虛寒證也四逆湯正十四真武湯去茯苓主之正十四

○又問小便數者何也腎與膀胱俱虛而有客熱乘之也二經既虛致受於客熱虛則不能制水故令數小便熱則水行澁澁則小便不快故令數起也診其趺陽脉數胃中熱即消穀引飲大便必硬小便即數也太陽病自汗四肢拘急難以屈伸心煩微惡寒脚攣急若小便數者慎不可行桂枝也且與甘草乾薑湯正五十五乃藥甘草湯也正五十七大抵洩數則大便難仲景云趺陽脉浮而濇浮則胃氣強濇即小便數浮濇相薄大便則鞭其脾為約麻子人圓主之正九二太

陽病若汗若吐若下後微煩小便數大便因鞭者與

小承氣湯

正四十三

和之愈○又云傷寒脉浮自汗小便

數若胃中不和譫語者少與調胃承氣湯

正四十三

發

問有數日不大便有大便難有大便鞭有

燥屎有大便澹

答曰傷寒數日不大便大便鞭及有燥屎皆知用大

柴胡

正三十一

大承氣

正四

小承氣

正四三

攻之然仲景論

大便不通亦有數種不可攻者

在第三卷第三問中詳言之矣

○仲

景又有陽結陰結之論不可不別也其脉浮而數能

食不大便此爲實名曰陽結宜用小柴胡湯
謂和其榮衛以通津液縱不了了得尿而解也其脉
沉而遲不能食身體重大便反硬名曰陰結宜用金
液丹所謂陽盛則促陰盛則結促結同也○又問大
便澹者何也古人云歲火不及寒乃大行民病泄澹
大率病人腸中有寒卽大便鳴澹蓋澹者胃中冷水
穀不別故也華佗云寒卽澹熱卽垢仲景說初鞭後
澹有二證小便不利小便少皆水穀不分耳

一百

問病人默默欲眠目不能閉起是不安其

咽所斷
唇被也

聲噎或咽乾

答曰此名狐惑傷寒也狐惑與濕蘊皆虫證初得狀如傷寒或因傷寒變成其疾其候默默欲眠目不能閉起居不安虫蝕其喉爲惑其聲噎虫食下部爲狐其咽乾狐惑之病並惡飲水面目乍赤乍白乍黑是其證也大抵傷寒病腹內熱入食少腸胃空虛三虫行作求食蝕人五臟及下部爲蠱病其候齒無色舌上盡白甚者唇黑有瘡四肢沉重忽忽喜眠虫蝕其肛爛見五臟則死當數看其上下唇上唇有瘡虫食

其臟也下唇有瘡重食其肛也殺人甚急多因下利

而得治蠱桃人湯

雜百五

黃連犀角湯

雜百六

雄黃銳散

主之

雜百七

百

問病人飲食復不能食常默默欲卧復不能卧欲出行復不能行飲食或有美時或有不快飯時如強健人而卧不能行如有寒如無寒如有熱復無熱口苦小便赤藥入即吐利

答曰此名百合傷寒也百脉一宗悉致其病無復經

絡也其狀欲食復不能食常默默欲得卧復不能卧
欲出行復不能行飲食或有美時或有不快飯時如
強健人而卧不能行如有寒如無寒如有熱復無熱
口苦小便赤百合之病諸藥不治藥入即吐利如有
神靈此多因傷寒虛勞大病之後不平復變成斯疾
也百合知母湯雜百七滑石代赭湯雜百九雞子湯雜百十
百合地黃湯雜百十一百合洗方雜百十二括樓牡蠣散雜百十三
滑石散雜百十四主之

活人書卷第十一終